

# Algorithmique des Réseaux Sociaux

26 Novembre

## Exercice 1 – Théorème d'Arrow

Nous allons montrer (avec les notations du cours) : avec au moins 3 candidats , il n'existe pas de règle de préférence satisfaisant (NRD), (P), (I) et (ND).

Dans toute la suite, nous considérons qu'il y a au moins 3 candidats et une règle de préférence satisfaisant (NRD), (P) et (I). Nous montrons tout d'abord le lemme suivant : si un candidat  $b$  est tel qu'il est classé par tous les votants, soit premier soit dernier alors il doit être soit premier soit dernier de la préférence collective.

1. Montrer que si  $a > b$  et  $b > c$  dans la préférence collective alors il en est de même en mettant  $c$  au dessus de  $a$  pour tous les votants.
2. Conclure concernant le lemme.

Soit  $b$  un candidat. Nous numérotions les votants de 1 à  $N$ . Considérons un profil où chaque votant place  $b$  en fin de classement, le reste des préférences étant arbitraire. Par (P), la préférence collective doit aussi mettre  $b$  en fin de classement. Nous modifions maintenant le profil en changeant la préférence de chacun des votants de 1 à  $N$  successivement en plaçant  $b$  en tête de classement.

3. Montrer qu'il existe un premier votant  $n(b)$  tel que  $b$  devienne le premier de la préférence collective. Montrer que  $n(b)$  ne dépend pas du reste des préférences des votants.

On note profil I, le profil des préférences juste avant que  $n(b)$  ne bouge  $b$  et profil II celui juste après.

Soit maintenant  $a$  et  $c$  deux candidats distincts de  $b$  tels que  $a >_{n(b)} c$ . On construit le profil III où le votant  $n(b)$  place  $a$  au-dessus de  $b$ .

4. Montrer que  $a > b$  et  $b > c$  dans la préférence collective correspondant au profil III.
5. En déduire que la préférence collective concernant  $ac$  doit toujours être celle de  $n(b)$ .
6. Conclure.

## Exercice 2 – Théorie du choix social et analyse de Fourier

On note  $\Omega_n = \{-1, 1\}^n$  munis de la loi uniforme. Pour des fonctions réelles  $f, g$  définies sur  $\Omega_n$ , on définit leur produit scalaire par :

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2^n} \sum_{x \in \Omega_n} f(x)g(x) = \mathbb{E}[f(x)g(x)].$$

La norme de  $f$  est alors  $\|f\|_2 = \sqrt{\langle f, f \rangle}$ . L'expansion de Fourier-Walsh est donnée par

$$f = \sum_{S \subset [n]} \hat{f}(S) \chi_S,$$

avec  $\chi_S(x) = \prod_{i \in S} x_i$ .

1. Montrer que pour tout  $x \in \Omega_n$ ,  $\chi_S(x)\chi_T(x) = \chi_{S\Delta T}(x)$  et que

$$\mathbb{E}[\chi_S(x)] = \begin{cases} 1, & \text{si } S = \emptyset, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

En déduire que les  $2^n$  fonctions  $\chi_S$  forment une base orthonormée pour les fonctions de  $\Omega_n$  à valeur dans  $\mathbb{R}$

2. Montrer que  $\langle f, g \rangle = \mathbb{E}[f(x)g(x)] = \sum \hat{f}(S)\hat{g}(S)$ .

3. Calculer les coefficients de Fourier de la fonction majorité de 3 variables.

4. Montrer que si  $f(-x) = -f(x)$  alors  $\hat{f}(S)$  est non nul uniquement pour  $|S|$  impaire.

On définit le biais de la fonction  $f : \{-1, 1\}^n \rightarrow \{-1, 1\}$  par

$$\mathbb{E}[f(x)] = \mathbb{P}(f(x) = 1) - \mathbb{P}(f(x) = -1)$$

5. Montrer que le biais de  $f$  est  $\hat{f}(\emptyset)$ .

Le poids de Fourier de  $f$  au niveau  $k$  est défini par :

$$W_k[f] = \sum_{S \subset [n] \mid |S|=k} \hat{f}(S)^2.$$

On définit la fonction Dictateur par :  $Dict_i(x) = x_i$  pour  $i \in [n]$ .

6. Montrer que si  $f : \{-1, 1\}^n \rightarrow \{-1, 1\}$  est telle que  $W_1[f] = 1$  alors  $f$  est soit un Dictateur soit la négation d'un Dictateur.

Etant donné  $\epsilon \in [0, 1]$ , on dit que les variables aléatoires  $x, y \in \{-1, 1\}^n$  sont  $(1 - 2\epsilon)$ -corrélées si  $x$  suit la loi uniforme et si  $y$  est obtenu à partir de  $x$  en changeant chaque composante avec probabilité  $\epsilon$  de manière indépendante. On a donc  $\mathbb{E}[x_i y_i] = 1 - 2\epsilon$ . La stabilité au bruit de  $f$  à  $1 - 2\epsilon$  est alors :  $Stab_{1-2\epsilon}(f) = \mathbb{E}_{x, y \text{ (1-2}\epsilon)} \text{cor}[f(x)f(y)]$ .

7. Montrer que

$$Stab_{1-2\epsilon}(f) = \sum_{k=0}^n (1 - 2\epsilon)^k W_k[f].$$

On modélise une élection de Condorcet avec 3 candidats de la façon suivante :

	1	2	...	$n$	société
A vs. B	+1	+1	...	$-1 =: x$	$f(x)$
B vs. C	-1	+1	...	$+1 =: y$	$f(y)$
C vs. A	+1	-1	...	$+1 =: z$	$f(z)$

8. Calculer les coefficients de Fourier de la fonction de 3 variables *NAE* Not All Equal (à valeur dans  $\{0, 1\}$ ).

9. Montrer que

$$\mathbb{E}[NAE(f(x), f(y), f(z))] = \frac{3}{4} - \frac{3}{4}\mathbb{E}[f(x)f(y)].$$

10. Montrer que dans la formule précédente  $\mathbb{E}[f(x)f(y)] = Stab_{-1/3}(f)$ .

11. En déduire le théorème d'Arrow pour 3 candidats.